

קיסריה: בעיר נמצאו קונכיות ארגמן חד קוצים שמפוזרים בשטחי חפירה שונים אך מספרם אינו רב, בחלקם קרוחים בנקבים קטנים (הדומים לקניבילים, תופעה הרומזת על גידולם בבריכות).²³⁹ נראה שמרכז העשיית הצביעה לא התקיים בתוך העיר עצמה, אלא באתרים שצפונית לעיר.

הל מכמורת: מיקומו כשלושה ק"מ מצפון לנהניה. במקום נחשפה מצודה פרסית שחלשה על הנמל הטבעי הקטן. באתר נלקטו קונכיות של חילזון הארגמן (לא מצוין המין) וכמה פרטים של ארגמנית אדומת פה. ממערב לחל נמצאו שרידים של שתי בריכות דגים מלאכותיות (piscine), הקשורות זו לזו בתעלה עם מוצא לים.²⁴¹

ח'רבת ג'יוס: אתר הנמצא מערבית ליישוב שפיים, כשלושה ק"מ בקו אירי מהחוף. נמצאו בו חלזונות של ארגמן חד קוצים במכלולים מהתקופות הביזנטית והערבית הקדומה.²⁴²

אפולוניה: האתר שוכן על המצוק בחוף הים של הרצליה. במכלולים מהתקופות הפרסית, ההלניסטית, הביזנטית והערבית קדומה, נמצאו מאות חלזונות; רובם מהמין ארגמן קהה קוצים, מיעוטם ממין חד-קוצים. הדומיננטיות של מינים אלה בהשוואה למינים אחרים שנמצאו באתר,²⁴³ והיות חלק מהם שבורים מאפשרים לדעת החוקרים להניח על עיסוק התושבים בהפקת צבע הארגמן (ראו תמונה מס' 2), אם כי לא נמצאו לכך עדויות תומכות נוספות.²⁴⁴

תל מיכל: האתר נמצא על מצוק כורכר סמוך לים בדרומה של הרצליה. מהתקופה הפרסית נמצאו שרידים של מיני רכיכות רבים, רובם חלזונות מהמינים קהה קוצים, חד-קוצים וארגמנית אדומת פה.²⁴⁵

239. פטריך, עמ' 129.

240. שפירא, היבטים, עמ' 528; איתן איילון במדע על-פה. אין פרטים נוספים לגבי כמות הקונכיות שנמצאו, בשל העדר פירסום מסודר בעניין זה, וריכוזי המשלוח והאנשים שעסקו בחפירות קיסריה במהלך השנים.

241. אנציקלופדיה לחפירות, ג, עמ' 947-949.

242. רול ואיילון, עמ' 221.

243. לפי קרמון אפולוניה, עמ' 275, שהתייחסה במאמרה רק לשכבות מהתקופה הפרסית וההלניסטית נמצאו בסה"כ 375 חלזונות; 330 ממשפחה ה-Muricidae, 63 ממין ארגמן קהה קוצים, 252 ממין חד קוצים, 15 ממין ארגמנית אדומת פה.

244. קרמון אפולוניה, עמ' 279-278; רול ואיילון, עמ' 36, תמונה 11, 221 וכן על פי מידע שמסר לי איתן איילון; אנציקלופדיה לחפירות, א, עמ' 53.

245. הולנג ופיג, עמ' 246, 242; רון ואיילון, עמ' 221.

